

睡眠時無呼吸治療を


心疾患などリスク低減

就寝時に呼吸が止まったり、浅くなったりする睡眠時無呼吸症候群(SAS)。心疾患や脳卒中のリスクが上がり、眠気で事故を起こす危険もあるにもかかわらず、放置する人が多い中、実際に治療してみた。

▽痩せた人でも

SASの大部分は、横にならざるで落ち込んだ舌の根元の舌根や鼻と口を隔てる軟口蓋が気道をふさいで起きる「閉塞性」のもの。肥満や加齢が原因になるが、実は痩せていても起きる。

治療ガイドラインの改定に当たる順天堂大順天堂医院の葛西隆敏睡眠・呼吸障害センター長は「日本の重症患者の60%は肥満ではない。小さい顎などアジア人特有の骨格も原因になる」と話す。



睡眠時無呼吸の治療法(イメージ)

CPAPは圧力のかかった空気を鼻から送り込み、気道を広げて呼吸を安定させる

CPAP

軽症ならマウスピース治療もあるが、第1選択はシーパップ(CPAP)。就寝時、圧力がかかった空気を鼻から吸うことで気道の開きを保ち、呼吸を安定させる。ただ使用者はまだ50万人強。「眠れない」と使用を断念する人も多い。

そんな中、在宅勤務の日々で体重が増え、いびきもひどくなり「呼吸が止まる」とも指摘されたため、かかりつけの耳鼻科で呼吸の状態や血中酸素を自宅で測る簡易検査を受けることとした。

SASの重症度は、1時間に10秒以上呼吸が止まる「無呼吸」と、10秒以上換気が低下する「低呼吸」の合計回数AHIで決まる。5以上15未満が軽症、15以上30未満が中等症、30以上で重症だ。検査の結果、左腕を下に寝ていると7だったAHIが無

呼吸時には血中酸素飽和度が80%に落ち、脈拍は160近くを記録。データを確認した先生は「心房細動を起しています」。CPAP使用となった。

▽消えた夜の眠気
使い始めて2カ月。初めは違和感が強く、無意識にマスクを外すことも。それを我慢して続けると、徐々に朝まで使える日が増えた。今では一晩で7時間程度使用し、AHIは正常値の2に。違和感は消え、真夜中の中途覚醒もない。朝食後や夕食後に感じた激しい睡魔もなくなった。

CPAPの長期使用での生命予後改善効果を確認した前向き調査の結果はまだない。だが葛西さんは「心肺の負担軽減で血圧は下がるとし、心房細動治療後の再発を抑え、心臓のポンプ機能が改善するなど、短期的な効果はいくつも確認されている」と強調する。

最近CPAPが使えない人向けの第3の治療法として、ペースメーカーのような機械を埋め込む「舌下神経電気刺激療法」も保険適用され、治療の道は広がった。葛西さんは「太っているなら10%の減量で症状が改善することも多い。それが難しいなら、放置せず治療を積極的に考えて」と訴えている。

知ってほしい 小児がん

小児がんは治る病気になりましたが、それには早期診断も大いに寄与しています。ですから子どもを診るお医者さんには、常に小児がんを疑っていただきたいのです。もちろん、その心配はほとんどが杞憂に終わります。でも小児がんも、早く見つかるほど治りやすいのですから、どうかよろしくお願ひします。

早期診断




イラスト 松川久美

がなかったり、痛みが続いたりする原因を調べると小児がんが見つかることがあります。膝や肘の痛みで小児リウマチと診断された子が、実は白血病だったということも時々あります。ところが皆さんは、子どもは「いつも泣いたり騒いだりしてうるさい」「自分の主張が痛めた」と受診したのに、実は大腿骨に骨肉腫があり、前から痛みを我慢していた子がいました。首から肩にかけてしこりが大きく腫れていたのに、誰にも相談せず髪の毛やシャツの襟で1年間隠していた女子中学生が、リンパ腫と診断されたこともあります。

ですから、子どもが自ら不調を訴えたときは、その原因を見つけないため、訴えに真剣に向き合ってください。特別な症状を訴えず、診察や検査で偶然見つかることもあります。鼻風邪で母に連れられ近所の医者を受診した2歳の男の子は、腹部の診察もしてくれた先生のおかげで肝臓の腫れが早い段階で見つかり、うちの病院へ紹介されて肝芽腫と診断されました。学校で行われた肥満検診の採血で貧血が判明し、「要精検」の通知で受診した小学生は、自覚症状はありませんでしたが、骨髄検査で白血病と診断されました。

症状疑い積極的に検査

子ども自身の訴えや何らかの診察や検査で所見があったら、小児がんを常に疑い、積極的に調べることで早期発見につながります。一般的な症状の裏に小児がんが潜んでいるか、いつも考えていることが必要です。(国立国際医療研究センター 小児科診療科長 七野浩之 (木曜日掲載))

ティータム 感謝を忘れず

秋になると、半世紀ほど前に仙台の大病院へ検査入院したことを思い出す。当時、私は、余命2年と医師から宣告されていた。病院に予約して3カ月後、両親に付き添われて病院へ行った。女関までの道路にはヒイラギが満開で、よい香りを漂わせていた。まるで私たちが歓迎しているかのような様子だった。大病院は広く、野菜、果物、



病理標本公開目指す

病理医・堤が 医療向上へ資金募る

精神疾患を除き、病気の病理標本を作る。それを病理診断で基本となるのは「病理医が顕微鏡で観察し、どのよう病気なのかを判断する」。藤田保健衛生大(現・藤田医科大学)教授を務めた愛知県稲沢市の病理医、堤寛さん(71)は半世紀近くかけて集めた約5千症例の標本をデジタル化しインターネットで公開するプロジェクトを



病理標本を手にする堤寛さん 愛知県稲沢市

「食の健康」に 甘い自己評価

米農務省農業研究所

多くの米国人が、自分の食生活が実際よりも健康的だと甘い評価をしているとする研究結果を、米農務省農業研究所のチームがまとめ、米栄養学会で発表した。成人約1万人の公的調査データを利用。食事の健康度を5段階(素晴らしい、

呼吸治療を

などリスク低減

くったりする睡眠時無呼吸症候群（SAS）が、眠気で事故を起こす危険もあるに
中 実際に治療してみた。

軽症ならマウスピース治療もあるが、第1選択はシーパップ（CPAP）。就寝時、圧力がかかった空気を鼻から吸うことで気道の開きを保ち、呼吸を安定させる。ただ使用者はまだ50万人強。「眠れない」と使用を断念する人も多い。

「危険も高まる」
SASは少ないが、呼吸の指令が出なくなり、SASもあり、害に多い。
細動も併発
患者は推定500
閉塞性SASは



SASの重症度は、1時間に10秒以上呼吸が止まる「無呼吸」と、10秒以上換気が低下する「低呼吸」の合計回数AHIで決まる。5以上15未満が軽症、15以上30未満が中等症、30以上で重症だ。

検査の結果、左腕を下に寝ていると7だったAHIが、あおむけでは45に。無呼吸は10%の減量で症状が改善することも多い。それが難しいなら、放置せず治療を積極的に考えている。

ティータイム

感謝を忘れずに生きる

秋になると、半世紀ほど前に仙台の大病院へ検査入院したことを思い出す。当時、私は、余命2年と医師から宣告されていた。病院に予約して3カ月後、両親に付き添われて病院へ行った。玄関までの道路にはヒイラギが満開で、よい香りを漂わせていた。まるで私たちが歓迎しているかの様子だった。

自宅に併設したクリニックで病理標本を保管する堤寛さん（愛知県稲沢市）



病理標本公開目指す

病理医・堤が 医療向上へ資金募る

精神疾患を除き、病気の診断で基本となるのは「病理診断」だ。臨床医が患者の体から採取した組織や細胞を使い、臨床検査技師が



病理標本を手にする堤寛さん（愛知県稲沢市）

病理標本を作る。それを病理医が顕微鏡で観察し、どのような病気なのかを判断する。藤田保健衛生大（現・藤田医科大学）教授を務めた愛知県稲沢市の病理医、堤寛さん（71）は半世紀近くかけて集めた約5千症例の標本をデジタル化しインターネットで公開するプロジェクトを計画している。

「教科書では、見える範囲にも症例数にも限界がある。ネットで公開すれば、いつでも世界中どこからでも使ってもらえる」と堤さん。まるで顕微鏡を扱ったようにパソコン画面で観察できる「バーチャル顕微鏡」というシステムで標本をデジタル化することを考えた。

早期診断




イラスト 松川久美

がなかったり、痛みが続いたりする原因を調べると小児がんが見つかることがあります。膝や肘の痛みで小児リュウマチと診断された子が、実は白血病だったということも時々あります。

向き合うべきだと思えます。特別な症状を訴えず、診察や検査で偶然見つかることもあります。鼻風邪で母に連れられ近所の医者を受診した2歳の男の子は、腹部の診察もしてくれ先生のおかげで肝臓の腫れが早い段階で見つかり、うちの病院へ紹介されて肝芽腫と診断されました。

「スポーツで友人とぶつかり痛めた」と受診したのに、実は大腿骨に骨肉腫があり、前から痛みを我慢していた子がいました。首から肩にかけてしこりが大きく腫れていたのに、誰にも相談せず髪の毛やシャツの襟で1年間隠していた女子中学生が、リンパ腫と診断されたこともあります。

子ども自身の訴えや何らかの診察や検査で見えなかったら、小児がんを常に疑い、積極的に調べることが早期発見につながります。一般的な症状の裏に小児がんが潜んでいるのか、いつも考えていることが必要です。

症状疑い積極的に検査

（国立国際医療研究センター 小児科診療科長 七野浩之）
（木曜日掲載）

「食の健康」に

甘い自己評価

米農務省農業研究局

多くの米国人が、自分の食生活が実際よりも健康的だと甘い評価をしているとする研究結果を、米農務省農業研究局のチームがまとめ、米栄養学会で発表した。

成人約1万人の公的調査データを利用。食事の健康度を5段階（素晴らしい、とても良い、良い、まあまあ、悪い）で自己評価してもらった結果と、実際の食事内容を照らし合わせると、健康度が一致していたのは全体の15%に過ぎなかった。

情報・ご意見は報道部くらし文化グループ「生活」係 〒310-8686 水戸市笠原町978番25 茨城県開発公社ビル

☎029 (239) 3024 FAX029 (301) 0362 メールkurashi@ibaraki-np.co.jp



第68回全日本

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

【通算37～58】

一手で流れが... 白2のツケはサ... 甘く、1自ほく損... 黒5とアジトを抱... は、サバキになっ... 田中さん、白6... 一本利かせて、白... に走る。黒9の圧... の上で、脱出に保... タンスをこれら... は学びたい方、健康... のためにオススシ... のスタジオリオになっ... ます!!

文部科学大臣特選 栗原金桂

Shogi board diagram showing pieces in positions 1 through 9.

（前譜指し）
4六歩 ○4
7五桂 ○7
7四金 ○6
6四金 ○7
同飛 ○同
5四桂 ○7
6六銀 ○7
同歩 ○同
同桂 ○同
まで通算94手

後手、優勢な
前譜で先手の栗原の飛車に気付かず、置に角を移動。後手さんはありがたく、戦いは後手が優勢になっている。栗原君4六歩